

7. Kongres Hrvatskog
torakalnog društva

7th Congress of Croatian
Thoracic Society

TORAKS

2017

Hotel Westin Zagreb

26. – 29. TRAVANJ / APRIL



ZBRINJAVANJE UTOPLJENIKA U JEDINICI INTENZIVNE NJEGE KLINIKE ZA PLUĆNE BOLESTI KBC SPLIT/ THE CARE DROWNING AT THE INTENSIVE CARE UNIT IN CLINIC FOR LUNG DISEASES SPLIT

BUDALIĆ J.¹, Ivanović D.¹

¹ KBC Split, Split, Croatia
Klinika za plućne bolesti

SAŽETAK

Uvod: Na području Splitsko – dalmatinske županije utapanje se najčešće događa pri aktivnostima u morskoj vodi. Klinika za plućne bolesti, KBC-a Split, je u periodu od 2011-2016. U Jedinici intenzivne njege zbrinula ukupno 125 bolesnika s dijagnozom utapanja, prosječne životne dobi 71.g., a više od pola zbrinutih su strani državljani.

Dijabetes, epilepsija i arterijska hipertenzija su najzastupljenije kronične bolesti kod utopljenika.

Prikaz slučaja: Pacijentica V.DŽ.(48.g.), koja inače boluje od epilepsije, primljena je u Jedinicu intenzivne njege kao utopljenica, nakon epileptičkog napadaja kada je izgubila svijest i upala u more. Pri prijemu pothlađena, blago dispnoična, hipoksična SpO₂ 66%. Pristupa se zbrinjavanju stalnim praćenjem vitalnih funkcija i stanja svijesti, uspostavljanju perifernog venskog puta i primjeni ordinirane medikamentozne i oksigenoterapije. Stanje bolesnice se popravlja te se nakon četiri dana otpušta na kućnu negu.

Zaključak: Unatoč srednjoj životnoj dobi, slučaj pacijentice (48.g.) pokazuje da bolesnici koji boluju od kroničnih bolesti (epilepsije, hipertenzije, dijabetesa) imaju veći rizik za utapanje. Potrebne su dodatne preventivne mjere i edukacija kroničnih bolesnika, naročito starije životne dobi (>65.g.), redoviti liječnički pregledi te nadzor kod bavljenja aktivnostima u vodi. Mjere oživljavanja ključne su za uspješan ishod spašavanja utopljenika. Edukacija sveopće populacije bi bila najvažniji korak u prevenciji utapanja.